

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	232	内用薬	タケキャブ錠10mg	10mg1錠	160.10円	100錠(10錠×10)、140錠(14錠×10)、500錠(10錠×50)、500錠(バラ)、700錠(14錠×50)	武田薬品	ポノプラザン フマル酸塩	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	<ul style="list-style-type: none"> 胃潰瘍、十二指腸潰瘍の場合 通常、成人にはポノプラザンとして1回20mgを1日1回経口投与する。なお、通常、胃潰瘍では8週間まで、十二指腸潰瘍では6週間までの投与とする。 逆流性食道炎の場合 通常、成人にはポノプラザンとして1回20mgを1日1回経口投与する。なお、通常4週間までの投与とし、効果不十分の場合は8週間まで投与することができる。 さらに、再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては、1回10mgを1日1回経口投与するが、効果不十分の場合は、1回20mgを1日1回経口投与することができる。 低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の場合 通常、成人にはポノプラザンとして1回10mgを1日1回経口投与する。 非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の場合 通常、成人にはポノプラザンとして1回10mgを1日1回経口投与する。 	処方	2014.12.26	新有効成分
			タケキャブ錠20mg	20mg1錠	240.20円	100錠(10錠×10)、140錠(14錠×10)、500錠(10錠×50)、500錠(バラ)、700錠(14錠×50)			<ul style="list-style-type: none"> 下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎 ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助の場合 通常、成人にはポノプラザンとして1回20mg、アモキシシリン水和物として1回750mg(カ価)及びクラリスロマイシンとして1回200mg(カ価)の3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。ただし、1回400mg(カ価)1日2回を上限とする。 プロトンポンプインヒビター、アモキシシリン水和物及びクラリスロマイシンの3剤投与によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合は、これに代わる治療として、通常、成人にはポノプラザンとして1回20mg、アモキシシリン水和物として1回750mg(カ価)及びメトロニダゾールとして1回250mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。 				

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
2	232	内用薬	バリエット錠5mg	5mg1錠	70.50円	100錠 (PTP、バラ)、140錠 (PTP14T×10)	エーザイ	ラベプラゾールナトリウム	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群、非びらん性胃食道逆流症、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	<胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison 症候群> 通常、成人には1回10mgを1日1回投与、病状により1回20mgを1日1回経口投与できる。 <逆流性食道炎> 通常、成人には1回10mgを1日1回投与、病状により1回20mgを1日1回経口投与できる。 再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては、1回10mgを1日1回投与する。 <非びらん性胃食道逆流症> 通常、成人には1回10mgを1日1回投与する。 <低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制> 通常、成人には1回5mgを1日1回投与、効果不十分の場合は1回10mgを1日1回投与できる。 <ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎>	処方	2014.12.26	新効能 新用量 剤型追加
3	396	内用薬	ジャディアンス錠 10mg	10mg1錠	205.50円	100錠 (10錠×10) PTP、700錠 (14錠×50) PTP	日本ベーリンガーインゲルハイム	エンバグリフロジン	2型糖尿病	通常、成人にはエンバグリフロジンとして10mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら25mg1日1回に増量することができる。	処方	2014.12.26	新有効成分
			ジャディアンス錠 25mg	25mg1錠	351.20円	100錠 (10錠×10) PTP							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
4	399	内用薬	オーファディンカプセル2mg	2mg1カプセル	3,960.60円	60カプセル(ボトル)	アステラス製薬	ニチシノン	高チロシン血症Ⅰ型	通常、ニチシノンとして1日1mg/kgを2回に分割して経口投与する。なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、1日2mg/kgを上限とする。	劇、処方	2014.12.26	新有効成分
			オーファディンカプセル5mg	5mg1カプセル	8,649.00円	60カプセル(ボトル)							
			オーファディンカプセル10mg	10mg1カプセル	15768.20円	60カプセル(ボトル)							
5	429	内用薬	ゼルボラフ錠240mg	240mg1錠	4,935.50円	8錠(PTP)×7シート	中外製薬	ベムラフェニブ	BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫	通常、成人にはベムラフェニブとして1回960mgを1日2回を経口投与する。	劇、処方	2014.12.26	新有効成分
6	392	注射薬	メチルチオニウム塩化物水和物50mg「第一三共」	50mg10mL1管	120,382円	1アンプル	第一三共	メチルチオニウム塩化物水和物	中毒性メトヘモグロビン血症	通常、生後3か月を過ぎた乳幼児、小児及び成人には、メチルチオニウム塩化物水和物として1回1~2mg/kgを5分以上かけて静脈内投与する。投与1時間以内に症状が改善しない場合は、必要に応じ、同量を繰り返し投与できるが、累積投与量は最大7mg/kgまでとする。 通常、新生児及び生後3か月以下の乳児には、メチルチオニウム塩化物水和物として1回0.3~0.5mg/kgを5分以上かけて静脈内投与する。投与1時間以内に症状が改善しない場合は、必要に応じ、同量を繰り返し投与できる。	劇、処方	2014.12.26	新有効成分
7	395	注射薬	ビミジム点滴静注液5mg	5mg5mL1瓶	129,908円	1バイアル	BioMarin Pharmaceutical Japan	エロスルファージェアルファ(遺伝子組換え)	ムコ多糖症ⅣA型	エロスルファージェアルファ(遺伝子組換え)として、1回体重1kgあたり2mgを週1回、点滴静注。	生物、劇、処方	2014.12.26	新有効成分
8	399	注射薬	コセンテックス皮下注用150mg	150mg1瓶	73,123円	1バイアル	ノバルティスファーマ	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬	通常、成人にはセクキヌマブ(遺伝子組換え)として、1回300mgを、初回、1週後、2週後、3週後、4週後に皮下投与し、以降、4週間の間隔で皮下投与する。また、体重により、1回150mgを投与することができる。	劇、処方	2014.12.26	新有効成分
			コセンテックス皮下注150mgシリンジ	150mg1mL1筒	73,132円	1シリンジ							
9	449	注射薬	治療用ダニアレゲンエキス皮下注「トリイ」10,000JAU/mL	2mL1瓶	4,320円	2mLバイアル1本	鳥居薬品	なし(コナヒョウヒダニエキス及びヤケヒョウヒダニエキスを含む水性注射剤)	ダニ抗原による下記アレルギー性疾患に対する減感作療法アレルギー性鼻炎、気管支喘息	減感作療法の実施に際し、ダニアレゲンに陽性の患者に皮内反応テストを行い、皮内反応閾値を求める。その閾値及びその時々患者の症状に応じ、初回投与濃度及び量、初回後の投与濃度又は量、投与回数、投与間隔並びに維持量は適宜定める。	処方	2014.12.26	新有効成分
			治療用ダニアレゲンエキス皮下注「トリイ」100,000JAU/mL	2mL1瓶	4,320円	2mLバイアル1本							
10	631	注射薬	メナクトラ筋注	0.5mL1瓶	19,827円	0.5mL×1バイアル	サノフィ	多糖体ジフテリアトキソイド結合体	髄膜炎菌(血清型A、C、Y及びW-135)による侵襲性髄膜炎菌感染症の予防	1回、0.5mLを筋肉内接種する。	生物、劇、処方	2014.7.4	新有効成分

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
11	634	注射薬	イロクテイト静注用 250	250国際単位1瓶(溶解液付)	26,766円	250国際単位×1バイアル [プレフィルドシリンジ (注射用水3mL) ×1シリンジ]	バイオジェン・アイデック・ジャパン	エフラロクトコブアルファ (遺伝子組換え)	血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制	本剤を添付の溶解液全量で溶解し、数分かけて緩徐に静脈内に投与する。 通常、1回体重1kg当たり10～30国際単位を投与するが、患者の状態に応じて適宜増減する。 定期的に投与する場合、通常、1日目に体重1kg当たり25国際単位、4日目に体重1kg当たり50国際単位から開始し、以降は患者の状態に応じて、投与量は1回体重1kg当たり25～65国際単位、投与間隔は3～5日の範囲で適宜調節する。週1回の投与を行う場合は、体重1kg当たり65国際単位を投与する。	生物、処方	2014.12.26	新有効成分
			イロクテイト静注用 500	500国際単位1瓶(溶解液付)	49,637円	500国際単位×1バイアル [プレフィルドシリンジ (注射用水3mL) ×1シリンジ]							
			イロクテイト静注用 750	750国際単位1瓶(溶解液付)	71,236円	750国際単位×1バイアル [プレフィルドシリンジ (注射用水3mL) ×1シリンジ]							
			イロクテイト静注用 1000	1000国際単位1瓶(溶解液付)	92,050円	1000国際単位×1バイアル [プレフィルドシリンジ (注射用水3mL) ×1シリンジ]							
			イロクテイト静注用 1500	1500国際単位1瓶(溶解液付)	132,105円	1500国際単位×1バイアル [プレフィルドシリンジ (注射用水3mL) ×1シリンジ]							
			イロクテイト静注用 2000	2000国際単位1瓶(溶解液付)	170,702円	2000国際単位×1バイアル [プレフィルドシリンジ (注射用水3mL) ×1シリンジ]							
			イロクテイト静注用 3000	3000国際単位1瓶(溶解液付)	244,983円	3000国際単位×1バイアル [プレフィルドシリンジ (注射用水3mL) ×1シリンジ]							
12	269	外用薬	ヘビオゲル2.5%	2.5%1g	120.90円	チューブ：15g×10	マルホ	過酸化ベンゾイル	尋常性ざ瘡	1日1回、洗顔後、患部に適量を塗布する。	処方	2014.12.26	新有効成分

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
13	269	外用薬	ロゼックスゲル 0.75%	0.75%1g	101.40円	50g (チューブ)	ガルデルマ	メトニダゾール	がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減	症状及び病巣の広さに応じて適量を使用する。潰瘍面を清拭後、1日1～2回ガーゼ等にのぼして貼付するか、患部に直接塗布しその上をガーゼ等で保護する。	なし	2014.12.26	新投与経路
14	729	注射薬	スクラッチダニアレ ゲンエキス「トリイ」 100,000JAU/mL	1mL1瓶	7,966円	1mL1本	鳥居薬品	なし(コナ ヒョウヒダニ エキス及びヤ ケヒョウヒダ ニエキスを含 有する液剤)	診断 アレルギー性疾患の アレルゲンの確認	診断 通常乱刺(ブリック)又は切皮(スクラッチ)法により皮膚面に出血しない程度に傷をつけ、本品1滴を滴下し、15～30分後に膨疹径が対照の2倍以上又は5mm以上を陽性とする。 なお、対照液はアレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」を用いる。	処方	2014.12.26	新有効成分

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。

- ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。