

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	114	内用薬	ワントラム錠100mg	100mg1錠	119.10円	PTP100錠、500錠	日本新薬	トラマドール塩酸塩	非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記における鎮痛・疼痛を伴う各種癌・慢性疼痛	通常、成人にはトラマドール塩酸塩として100～300 mg を1日1回経口投与する。なお、症状に応じて適宜増減する。ただし、1日400 mg を超えないこととする。	劇、処方	2015.3.26	新剤型・新用量
2	119	内用薬	ノピコールカプセル2.5µg	2.5µg1カプセル	1,795.00円	PTP14カプセル(14カプセル×1) PTP140カプセル(14カプセル×10)	東レ・メディカル	ナルフラフィン塩酸塩	次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る) 血液透析患者、慢性肝疾患患者	通常、成人には、ナルフラフィン塩酸塩として1日1回2.5 µgを夕食後又は就寝前に経口投与する。なお、症状に応じて増量することができるが、1日1回5 µgを限度とする。	劇、処方	2014.12.26	新有効成分
3	219	内用薬	オプスミット錠10mg	10mg1錠	1,4594.00円	30錠(15錠×2) PTP	アクテリオンファーマシューティカルズ ジャパン	マシテンタン	肺動脈性肺高血圧症	通常、成人には、マシテンタンとして10 mg を1日1回経口投与する。	劇、処方	2015.3.26	新有効成分
4	396	内用薬	ザファテック錠50mg	50mg1錠	559.20円	20錠(2錠シート×10)	武田薬品工業	トレラグリブチンコハク酸塩	2型糖尿病	通常、成人にはトレラグリブチンとして100mg を1週間に1回経口投与する。	処方	2015.3.26	新有効成分
			ザファテック錠100mg	100mg1錠	1,045.10円	20錠(2錠シート×10)							
5	399	内用薬	サデルガカプセル100mg	100mg1カプセル	76,925.90円	14カプセル1シートPTP	ジェンザイム・ジャパン	エリグルスタット酒石酸塩	ゴーシェ病の諸症状(貧血、血小板減少症、肝脾腫及び骨症状)の改善	通常、CYP2D6 Extensive Metabolizer 及び Intermediate Metabolizer の成人にはエリグルスタット酒石酸塩として1回100 mg を1日2回経口投与する。なお、患者の状態に応じて適宜減量する。	劇、処方	2015.3.26	新有効成分
6	429	内用薬	レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル	3,956.40円	20カプセル(PTP10C×2)	エーザイ	レンバチニブメシル酸塩	根治切除不能な甲状腺癌	通常、成人にはレンバチニブとして1日1回24mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	2015.3.26	新有効成分
			レンビマカプセル10mg	10mg1カプセル	9,354.20円	20カプセル(PTP10C×2)							
7	429	内用薬	ボマリストカプセル1mg	1mg1カプセル	42,624.80円	7カプセル(7カプセル×1)	セルジーン	ボマリドミド	再発又は難治性の多発性骨髄腫	デキサメタゾンとの併用において、通常、成人にはボマリドミドとして1日1回4mgを21日間連日経口投与した後、7日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	毒、処方	2015.3.26	新有効成分
			ボマリストカプセル2mg	2mg1カプセル	50,802.00円	7カプセル(7カプセル×1)							
			ボマリストカプセル3mg	3mg1カプセル	56,294.50円	7カプセル(7カプセル×1)							
			ボマリストカプセル4mg	4mg1カプセル	60,548.00円	7カプセル(7カプセル×1)							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
8	449	内用薬	アシテアダニ舌下錠100単位 (IR)	100IR1錠	67.10円	PTP1錠 (1錠×1) PTP2錠 (2錠×1)	塩野義製薬	なし (ヤケヒョウヒダニエキス原末及びコナヒョウヒダニエキス原末を含有する舌下錠)	ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎に対する減感作療法	通常、成人及び12歳以上の小児には、1回100単位 (IR) を1日1回舌下投与から開始し、1回投与量は100単位 (IR) ずつ、300単位 (IR) まで増量する。なお、漸増期間は、原則として3日間とするが、患者の状態に応じて適宜延長する。舌下投与後は完全に溶解するまで保持した後、飲み込む。その後5分間は、うがいや飲食を控える。	処方	2015.3.26	新有効成分
			アシテアダニ舌下錠300単位 (IR)	300IR1錠	201.20円	PTP30錠 (10錠×3)							
9	625	内用薬	ソバルディ錠400mg	400mg1錠	61,799.30円	28錠瓶	ギリアド・サイエンシズ	ソホスビル	セログループ2 (ジェノタイプ2) のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善	リバビリンとの併用において、通常、成人にはソホスビルとして400mgを1日1回、12週間経口投与する。	処方	2015.3.26	新有効成分
10	117	注射薬	エビリファイ持続性水懸筋注用300mg	300mg 1瓶 (懸濁用液付)	38,212円	1バイアル (懸濁用液 日局注射用水2mL及びPSFバイアルアダプター1個を添付)	大塚製薬	アリピプラゾール水和物	統合失調症	通常、成人にはアリピプラゾールとして1回400mgを4週に1回臀部筋肉内に投与する。なお、症状、忍容性に応じて1回量300mgに減量すること。	劇、処方	2015.3.26	新投与経路
			エビリファイ持続性水懸筋注用400mg	400mg 1瓶 (懸濁用液付)	46,480円	1バイアル (懸濁用液 日局注射用水2mL及びPSFバイアルアダプター1個を添付)							
			エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ	300mg1キット	38,271円	1シリンジ							
			エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	400mg1キット	46,539円	1シリンジ							
11	429	注射薬	サイラムザ点滴静注液 100mg	100mg10mL 1瓶	75,265円	1バイアル (10mL)	日本イーライリリー	ラムシルマブ (遺伝子組換え)	治療切除不能な進行・再発の胃癌	通常、成人には2週間に1回、ラムシルマブ (遺伝子組換え) として1回8mg/kg (体重) をおよそ60分かけて点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。	生物、劇、処方	2015.3.26	新有効成分
			サイラムザ点滴静注液 500mg	500mg50mL 1瓶	355,450円	1バイアル (50mL)							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
12	612	注射薬	オールドレブ点滴静注用 150mg	150mg1瓶	8,261円	1バイアル	グラクソ・ス ミスクライン	コリスチン メタンスル ホン酸ナト リウム	<適応菌種> コリスチンに感性の大腸 菌、シトロバクター属、ク レブシエラ属、エンテロバ クター属、緑膿菌、アシネ トバクター属 ただし、他の抗菌薬に耐性 を示した菌株に限る <適応症> 各種感染症	通常、成人には、コリスチンとして1回1.25 ~2.5 mg (力価) /kgを1日2回、30分以 上かけて点滴静注する。	劇、処方	2015.3.26	新投与経路
13	634	注射薬	ノボサーティーン静注用 2500	2,500国際単 位1瓶(溶解 液付)	3,648,446円	1バイアル(日 本薬局方注射用 水3.2mL添付)	ノボ ノル ディスク ファーマ	カトリデカ コグ(遺伝 子組換え)	先天性血液凝固第XIII因子 Aサブユニット欠乏患者に おける出血傾向の抑制	本剤を添付の溶解液全量で溶解し、2mL/分を 超えない速度で緩徐に静脈内に注射する。 体重1kg当たり35国際単位を4週ごとに定期的 に投与する。 なお、出血時に投与する場合、体重1kg当たり 35国際単位を投与することができる。	処方	2015.3.26	新有効成分
14	729	注射薬	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ5mL ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ7.5mL ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ10mL	60.47%5mL 1筒 60.47%7.5m L1筒 60.47%10m L1筒	5,114円 7,457円 9,745円	5mL×5 7.5mL×5 10mL×5	バイエル薬品	ガドブト ロール	磁気共鳴コンピューター断 層撮影における下記造影 脳・脊髄造影 躯幹部・四肢造影	通常、本剤0.1 mL/kgを静脈内投与する。	処方	2015.3.26	新有効成分
15	225	外用薬	エクリラ400µgジェヌエ ア30吸入用	30吸入1キッ ト	3,150.90円	1個	杏林製薬	アクリジニ ウム臭化物	慢性閉塞性肺疾患(慢性気 管支炎、肺気腫)の気道閉 塞性障害に基づく諸症状の 緩解	通常、成人には1回1吸入(アクリジニウム臭 化物として400 µg)を1日2回吸入投与する。	処方	2015.3.26	新有効成分
16	269	外用薬	デュアック配合ゲル	1g	157.40円	10g×10 (チューブ)	グラクソ・ス ミスクライン	クリンダマ イシンリン 酸エステル 水和物/過酸 化ベンゾイ ル	<適応菌種> 本剤に感性のプロウ球菌 属、アクネ菌 <適応症> 尋常性ざ瘡	1日1回、洗顔後、患部に適量を塗布する。	処方	2015.3.26	新有効成分・新医療用 配合

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。

- ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。