

報告品目・新キット製品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	備考
1	117	内用薬	レメロン錠30mg	30mg1錠	281.00円	MSD	ミルタザピン	うつ病・うつ状態	通常、成人にはミルタザピンとして1日15mgを初期用量とし、15～30mgを1日1回就寝前に経口投与する。なお、年齢、症状に応じ1日45mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として15mgずつ行うこと。	再審査期間中の規格追加
	117	内用薬	リフレックス錠30mg	30mg1錠	282.00円	Meiji Seika ファルマ			再審査期間中の規格追加	
2	339	内用薬	エフィエント錠20mg	20mg 1錠	1,150.20円	第一三共	プラスグレル塩酸塩	経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される下記の虚血性心疾患 急性冠症候群(不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞) 安定狭心症、陳旧性心筋梗塞	通常、成人には、投与開始日にプラスグレルとして20mgを1日1回経口投与し、その後、維持用量として1日1回3.75mgを経口投与する。	再審査期間中の規格追加
3	619	内用薬	ポノサップバック400	1シート	733.80円	武田薬品工業	ポノブラザン フマル酸塩/アモキシシリン水和物/クラリスロマイシン	<適応菌種> アモキシシリン、クラリスロマイシンに感性のヘリコバクター・ピロリ <適応症> 胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃MALTリンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	通常、成人にはポノブラザンとして1回20mg、アモキシシリン水和物として1回750mg(カ価)及びクラリスロマイシンとして1回200mg(カ価)の3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。ただし、1回400mg(カ価)1日2回を上限とする。	再審査期間中の剤型追加
	619	内用薬	ポノサップバック800	1シート	884.00円				再審査期間中の剤型追加	
4	619	内用薬	ポノピオンバック	1シート	654.60円	武田薬品工業	ポノブラザン フマル酸塩/アモキシシリン水和物/メトロニダゾール	<適応菌種> アモキシシリン、メトロニダゾールに感性のヘリコバクター・ピロリ <適応症> 胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃MALTリンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	プロトンポンプインヒビター、アモキシシリン水和物及びクラリスロマイシンの3剤投与によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合 通常、成人にはポノブラザンとして1回20mg、アモキシシリン水和物として1回750mg(カ価)及びメトロニダゾールとして1回250mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。	再審査期間中の剤型追加
5	721	内用薬	コロンフォート内用懸濁液25%	25%32mL1瓶	501.60円	伏見製薬所	硫酸バリウム	腸内容物の標識による大腸コンピューター断層撮像の補助	通常、成人には、本剤1回32mL(硫酸バリウムとして8g)を検査前日から毎食後に3回経口投与する。	新効能医薬品、新用量医薬品、剤形追加にかかる医薬品(再審査期間中でないもの)
6	249	注射薬	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」	300単位1キット	1,528円	富士フイルムファーマ	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	インスリン療法が適応となる糖尿病	通常、成人では、初期は1日1回4～20単位を皮下注射するが、ときに他のインスリン製剤を併用することがある。注射時刻は朝食前又は就寝前のいずれでもよいが、毎日一定とする。投与量は、患者の症状及び検査所見に応じて増減する。なお、その他のインスリン製剤の投与量を含めた維持量は、通常1日4～80単位である。ただし、必要により上記用量を超えて使用することがある。	バイオ後続品：新キット製品
7	399	注射薬	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg1mL1キット	28,233円	プリストル・マイヤーズ	アバタセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ(既存治療で効果不十分な場合に限る)	通常、成人には、投与初日に負荷投与としてアバタセプト(遺伝子組換え)点滴静注製剤の点滴静注を行った後、同日中に本剤125mgの皮下注射を行い、その後、本剤125mgを週1回、皮下注射する。また、本剤125mgの週1回皮下注射から開始することができる。	新キット製品

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	備考
8	116	外用薬	ニュープロパッチ18mg	18mg 1枚	1017.20円	大塚製薬	ロチゴチン	パーキンソン病	通常、成人にはロチゴチンとして1日1回4.5mg/日からはじめ、以後経過を観察しながら1週間毎に1日量として4.5mgずつ増量し維持量(標準1日量9mg~36mg)を定める。なお、年齢、症状により適宜増減できるが、1日量は36mgを超えないこと。 本剤は肩、上腕部、腹部、側腹部、臀部、大腿部のいずれかの正常な皮膚に貼付し、24時間毎に貼り替える。	再審査期間中の規格追加
9	225	外用薬	エクリラ400µgジェンエア60吸入用	60吸入1キット	6,224.40円	杏林製薬	アクリジニウム臭化物	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解	通常、成人には1回1吸入(アクリジニウム臭化物として400µg)を1日2回吸入投与する。	新有効成分含有医薬品

- ・内容についての詳細な情報又は正確な情報は、添付文書等をご参照下さい。
- ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。