

都道府県薬剤師会担当役員殿

日本薬剤師会  
担当副会長 川上 純一

「パキロビッド<sup>®</sup>パック」の調剤に関する注意喚起について

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「パキロビッド<sup>®</sup>パック」(有効成分:ニルマトレルビル、リトナビル)は、SARS-CoV-2 感染症に用いる薬剤として、2月10日に特例承認されたところです。

国からの通知を含め、パキロビッド<sup>®</sup>パックの使用に関しては、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド<sup>®</sup>パック)の医療機関及び薬局への配分について」(事務連絡 令和4年2月10日)としても通知しておりますが、本剤の調剤に際しては、下記の点にご留意いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、本剤には併用禁忌及び併用注意の薬剤が多数あることから、現在使用中の他の薬剤との相互作用が予想されます。このため本会では、本剤を取り扱う薬局は、医師に対して、より適切な薬剤への代替や休薬等に関する情報の提供等が必要となる場面もあると認識しています。

会務ご多用のところ恐縮ながら、本剤の調剤・備蓄等に関する貴会会員にご周知下さるようお願い申し上げます。

記

- 上記通知に含まれる厚労省の通知や、添付文書等の記載事項を十分考慮すること。また、特に以下の点に留意すること。
  - 併用禁忌及び併用注意の薬剤が多数あることから、調剤時には、患者本人への聞き取りのほか、必要に応じ、当該患者のかかりつけ薬剤師・薬局や過去に利用した薬局等と連携するなどし、服薬中のすべての薬剤を確認するよう十分に注意すること。
  - 現在使用中の他の薬剤との相互作用が予想される場合には、より適切な薬剤への代替や休薬等に関する情報の医師への提供等について検討すること。
  - 重度の腎機能障害のある患者への投与は推奨されていない。

- 中等度の腎機能障害患者では、朝及び夕方の服用分それぞれから、ニルマトレルビル錠2錠のうち1錠を取り除き、取り除いた箇所に専用のシールを貼り付けて交付すること。
- SARS-CoV-2感染症の症状が発現してから速やかに投与を開始すること。
- 5日間服用すること（勝手に中断・中止しないこと）

以上